


生理機能・クリアランス試験


実施スケジュール

尿酸クリアランス




1. 検査の3日前より低プリン食摂取とする。
 2. 早朝空腹時(検査当日の朝)重曹約1gを300mLの水とともに服用させる。
 3. 検査時さらに水300mLを飲水。
 4. 30分後放尿する。(0分とする)
 5. 0分より30分後に2mL採血する。
 6. さらに0分より60分後に採尿する。尿量を測定し依頼書に記載。
5ml提出。
- *身長、体重、採血時刻、採尿時刻、尿量を依頼書に必ず記入して下さい。

PFDテスト




1. PFD液服用前に採尿する。(一部を前尿として提出)
2. PFD液を200mLの水とともに飲ませる。
3. 約1時間後、利尿のためにコップ1杯相当の水を飲ませる。
4. 開始から6時間まで蓄尿し、尿量を測定し依頼書に記載。尿量の一部を前尿とともに提出。

ICGテスト




1. ジアグノグリーン25mgを注射用蒸留水5mLに溶かし、体重10kgにつき1mLを静注する。
2. 血中停滞率測定の場合には注射前と注射後15分に注射の反対側から各3mL採血する。
3. 血中消失率測定の場合には注射前と注射後5、10、15分の3回、注射の反対側から各3mL採血する。

クレアチニン クリアランス



1. 排尿後微温水約500mLを飲ませる。
 2. 飲水後約60分後に完全排尿させ、この時刻を試験開始とする。
 3. 開始30分後、約2mL採血する。
 4. 開始1時間後、完全採尿する。尿量を測定し依頼書に記載。1時間尿量の一部を提出。
 5. 正確を期す場合は更にスケジュールを1時間延長する。
(開始1時間30分後、第2回目の採血。開始2時間後に第2回目の採尿)
- * 身長、体重、採血時刻、採尿時刻、1時間尿量を依頼書に必ず記入して下さい。

24時間内因性クレアチニン クリアランス



1. 朝の一定時刻に完全に排尿させ、これを捨てる。
 2. 以後の尿を翌朝の同時刻まで蓄尿する。尿量を測定し依頼書に記載。
24時間尿量の一部を提出。
 3. 昼前に約2mL採血する。
- * 身長、体重、尿量を依頼書に必ず記入して下さい。